

Distanza della Galassia di Andromeda



Introduzione

Misurare la distanza dei corpi celesti è complicato. Per gli oggetti più vicini, come la Luna e alcuni pianeti, si inviano segnali radio e si calcola il tempo che impiega il segnale a ritornare sulla Terra. Per le stelle vicine è possibile ottenere misure di distanza abbastanza accurate con il metodo della parallasse.

Determinare la distanza degli oggetti distanti diventa però molto difficile. Da Terra possiamo misurare solo la magnitudine apparente delle stelle e non quanto esse siano realmente luminose. Una stella piccola e poco luminosa, vicina alla Terra, appare uguale a una stella grande e molto luminosa, lontana dalla Terra.

Fino al 20° secolo questo importante problema della determinazione delle distanze non aveva ancora trovato soluzione. A quel tempo si era maggiormente interessati a determinare la distanza delle cosiddette „nebulose“. Scrutando il cielo erano stati scoperti molti di questi oggetti diffusi. Alcuni astronomi pensavano che fossero nubi di gas all'interno della nostra Via Lattea. Altri credevano che fossero isole piene di stelle, galassie indipendenti e a distanze molto elevate. Se questo fosse vero, il nostro Universo sarebbe molto più grande di quanto pensato in precedenza.

Senza un modo per determinare la distanza di questi oggetti nebulari non era però possibile risolvere il dilemma. Il primo passo verso un metodo per la misura della distanza venne da Henrietta Swan Leavitt, che nel 1912 studiò un gruppo di stelle variabili chiamate „Cefeidi“. Queste stelle cambiano la loro luminosità periodicamente, con un periodo di alcuni giorni. Leavitt trovò che il periodo della variazione di luminosità era connesso con la magnitudine assoluta delle stelle!

Quindi conoscendo il periodo P di una cefeide, si può utilizzare la seguente formula per determinare la magnitudine assoluta M :

$$M = -1.43 - 2.81 * \log (P)$$

(P è misurato in giorni)

Ora conosciamo la reale luminosità della stella e possiamo confrontare questo valore con la magnitudine apparente m , che può essere facilmente misurata. Sapendo quanto luminosa è la stella, e quanto luminosa appare, possiamo calcolare il cosiddetto modulo di distanza:

$$m - M = -5 + 5 \log r$$

dove r è la distanza dell'oggetto misurata in parsec (1 parsec = 3.26 anni luce o 31 trilioni di chilometri).

Nel 1923 Edwin Hubble riuscì a osservare alcune Cefeidi nella galassia di Andromeda e, con questo metodo, determinare così la sua distanza: era chiaramente un oggetto distante fuori dalla nostra Via Lattea e una galassia indipendente!

Misurare la distanza di Andromeda con Aladin

Per misurare la distanza di Andromeda con Aladin abbiamo innanzitutto bisogno di dati osservativi. Per utilizzare la relazione Periodo - Luminosità cerchiamo nell'Osservatorio Virtuale (VO) dati sulle Cefeidi nella galassia di Andromeda:

File -> Apri, poi scegliere „All ViZieR“ dal menu „server cataloghi“



Image 1: Searching the VO for cepheid data.

Nel campo „oggetto“ scrivere „Andromeda“ (o „M31“). Poiché non sappiamo quale catalogo contenga i dati che ci interessano, nel campo „autore, testo“ scriviamo „cepheid“. Cliccando su „inltra“ iniziamo la ricerca.

Otteniamo così 3 cataloghi (il campo „descrizione“ contiene maggiori informazioni sui dati):




Image 2: 3 catalogs were found

Scegliamo il catalogo più recente: quello del 2003. Nella finestra principale di Aladin compaiono le posizioni degli oggetti del catalogo, mentre a destra nella catasta di piani vediamo il simbolo del catalogo (J.A+A 402.113):




Image 3: A catalog was loaded

Ora vogliamo esplorare in maggior dettaglio i dati del catalogo. Selezioniamo tutti gli oggetti, nella finestra delle misurazioni (sotto la finestra principale) vediamo le informazioni sui dati del catalogo:




Image 4: Displaying the catalog data

„ID“ è l'identificatore della stella; „RAJ2000“ e „DEJ2000“ sono l'ascensione retta e la declinazione della stella. „Rcmag“ e „lcmag“ sono la magnitudine apparente della stella in differenti filtri. „DeltaRc“ è l'errore della misura e „lcFile“ e „RcFile“ portano alle curve di luce dettagliate della stella.

La colonna „Per“ riporta il periodo della stella ed è una di quelle che ci interessano maggiormente. Guardando l'intera lista di oggetti notiamo però che non tutti hanno riportato il valore del periodo. Per visualizzare solo le stelle di cui è riportato il periodo, definiamo un filtro:

Catalogo -> Crea un filtro




Image 5: Creating a filter

scegliamo „Per“ dal menu „colonne“. Nella finestra del filtro vediamo il termine „ $\${Per}$ “. Poiché vogliamo solo gli oggetti per i quali esiste il periodo, cambiamo questo termine in „ $\${Per} > 0$ “. Per visualizzare questi dati nella finestra di Aladin, aggiungiamo un'ultima modifica: „ $\${Per} > 0$ {draw}“. Cliccando „applica“ il filtro viene applicato e nella finestra principale di Aladin vediamo ora solo le stelle con un periodo noto.

Ora utilizziamo la relazione periodo-luminosità per calcolare la distanza delle stelle.

Innanzitutto, creiamo una nuova colonna nel catalogo:

Catalogo -> aggiungi come nuova colonna

Nella finestra „calcolatore delle colonne“ inseriamo il nome della nuova colonna, per esempio „M“, l'abbreviazione tradizionale della magnitudine assoluta (possiamo ignorare i campi UCD e unità).

Ora dobbiamo specificare come calcolare la nuova colonna. Nel campo „espressione“ inseriamo la formula della relazione periodo-luminosità:

$$1.43 - 2.81 * \log(\${Per})$$

Cliccando su „aggiungi nuova colonna“ Aladin effettua i calcoli e visualizza la nuova colonna.

Abbiamo bisogno di una ulteriore nuova colonna, in cui calcolare la distanza utilizzando il modulo di distanza.

Ripetiamo quindi la procedura e usando l'espressione:

$$(10^{(\${Icmag} - \${M} + 5) / 5}) * 3.26$$

La moltiplicazione per 3.26 converte il risultato da parsec in anni luce. La finestra delle misurazioni di Aladin ora mostra la distanza di tutte le cefeidi.

Notiamo che questo metodo è abbastanza approssimativo. Per ottenere risultati esatti è necessario determinare con precisione le costanti della relazione periodo-luminosità in base ai filtri utilizzati per la misura della luminosità.

Calcolando il valore medio dei nostri risultati otteniamo comunque un buon valore: la galassia di Andromeda dista 2.52 +/- 0.14 milioni di anni luce!